



Pour plus d'informations :

- Contactez votre conseiller
- Envoyez nous un mail : accueil@elvup.fr
- Appelez-nous au : 0 214 220 100

Le siège :

52 bd du 1^{er} Chasseurs

61000 Alençon

Tél : 0 214 220 100

Mail : accueil@elvup.fr

www.elvup.fr




Test sur échantillon de lait individuel à réaliser en même temps que la pesée

PARATUBERCULOSE

Quelles vaches sont positives ?





UN TEST SIMPLE

REPÉRER LES ANIMAUX INFECTÉS

La paratuberculose est une maladie chronique contagieuse de l'intestin, mal identifiée et aux conséquences souvent ignorées. Il n'existe pas de traitement. Le plan de lutte passe par le repérage des animaux infectés pour mieux maîtriser la maladie.

Pourquoi ?

- Baisse de la production de lait : - 500 à - 2000 kg / lactation
- Diminution du taux (TB, TP)
- Faiblesse de l'immunité : jusqu'à 40% de mammites en plus
- Baisse de la valeur bouchère
- Réformes prématurées

Pertes estimées : 200 à 300 € / VL / lactation en phase sub-clinique et jusqu'à 750 € / VL / lactation en phase clinique

Une maladie qui se cache !

Une belle vache mais qui est fortement excrétrice et contamine le reste du troupeau.

Un animal malade avec diarrhée et amaigrissement qui dissimule de nombreux animaux infectés dans le troupeau.

Quand ?

- Suite à plusieurs notes de tank positives
- Dans le cadre d'un plan de maîtrise en cours ou à démarrer
- Pour vérifier l'efficacité des actions mises en place
- À l'arrivée des primipares ou de nouvelles vaches dans l'atelier laitier

Donne un indicateur sur le taux de prévalence (% animaux positifs) dans son troupeau



UNE DÉTECTION PRÉCOCE

DES ANALYSES RÉGULIÈRES

Comment ?

Lors du contrôle de performance :

- Réalisé sur lait individuel
- Analysé par le LILANO, sur les mêmes échantillons que ceux prélevés pour le contrôle de performance
- Détection des anticorps par méthode ELISA (test IDEXX)

Les avantages :

- Aucune contention, aucun stress pour l'animal
- Facile à mettre en œuvre
- Pas de frais de prélèvement
- Retour des résultats sous 10 jours
- Renouvelable plusieurs fois par an
- Résultats historisés vache à vache

Répétez les analyses 2 à 3 fois par an

Animal négatif

Un animal infecté, surtout lorsqu'il ne présente pas encore de symptômes, ne produit pas tout le temps des anticorps repérables par les analyses

Animal positif

Pas de décision de réforme sur une seule analyse !

Confirmer par une 2e analyse à 4-6 mois d'intervalle ou par PCR sur fèces pour les animaux à haute valeur génétique

Jouer la sécurité : mettre en place des mesures de maîtrise sanitaire sans attendre la confirmation